



# ПОЛІОМІЄЛІТ




Інформаційний  
бюлетень

## СИМПТОМИ ПОЛІОМІЄЛІТУ

Прояви хвороби можуть бути різними:

- Жодних симптомів - без будь-яких проявів хвороба протікає у понад 70% випадків, що робить її особливо небезпечною для оточуючих.
- Грипоподібні симптоми - лихоманка, головний біль, біль у животі й горлі, нудота і блювання - протягом кількох днів може проявлятися один чи кілька з них.
- Рухові розлади - сильний біль у вражених м'язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин. Параліч - найтяжчий симптом, пов'язаний із поліомієлітом, оскільки він може призвести до постійної інвалідності та смерті. Параліч може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя.
- Поліомієліт вражає дихальні м'язи, що часто призводить до смерті. При одужанні після поліомієліту функція вражених хворобою нервів і м'язів не відновлюється.
- Дуже рідко симптомом ураження поліовірусом центральної нервової системи також буває менінгіт.
- У 20-40% одужавших може розвиватися постполіомієлітний синдром : діти, які, здається, повністю вилікувалися, можуть відчувати новий м'язовий біль, слабкість або параліч у дорослому віці, через десятки років після первинного захворювання.



## ПОЛІОМІЄЛІТ

Гостре інфекційне захворювання, викликане поліовірусом. Характеризується ураженням нервової системи (переважно сірої речовини спинного мозку), що призводить до паралічів, які спричиняють інвалідність і є небезпечним для життя. Поліовірус передається від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу, воду, - та розмножується в кишківнику.

Хворіють на поліомієліт невакциновані діти й дорослі, та найбільший ризик мають малюки віком до п'яти років, тому вакцина від поліо - у числі тих, які діти отримують у перші місяці життя відповідно до Національного календаря щеплень.

За даними МОЗ, станом на 1 вересня 2021 року лише 53,0 % дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту. Необхідний показник для формування колективного імунітету - 95 %.

Найнижчий рівень охоплення щепленнями в Херсонській - 40,7 %, Івано-Франківській - 42,2 %, Закарпатській - 43,1 %, Запорізькій - 46,2 %, Харківській - 46,5 %, в Одеській та Київській областях - 47,5 %.

У Чернівецькій та Львівській - по 48,5 %, у Рівненській - 48,9 %.

Найвищий рівень охоплення щепленнями - у м. Київ - 73,5 %.

## ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПОЛІОМІЄЛІТУ

- Поліомієліт неможливо остаточно вилікувати, він загрожує величезній кількості невакцинованих та не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю. Але йому можна запобігти, зробивши щеплення. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти до п'яти років, саме тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя. Шістьох доз вакцини достатньо, щоб сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя.
- Лікуванням поліомієліту займається інфекціоніст. При розвитку наслідків або ускладненій течії, для допомоги хворому залучається невролог (або дитячий невролог, якщо хворіє дитина).
- Специфічних протівірусних препаратів для боротьби із поліовірусом немає. Лікування поліомієліту полягає у симптоматичній терапії. Після усунення гострих проявів, призначаються спеціальні препарати для поліпшення нервово-м'язової провідності. При розвитку паралічу дихальних м'язів необхідне підключення до апарату ШВЛ у палаті реанімації.
- Особливо важкими наслідками поліомієліту є летальні випадки, які відбуваються у 10% хворих. Смерть може наступати при ураженнях життєво важливих ділянок головного або спинного мозку.