




ВАКЦИНАЦІЯ COVID-19. ХТО І КОЛИ МАЄ ВАКЦИНУВАТИСЬ



ІНФОРМАЦІЙНИЙ
БЮЛЕТЕНЬ

Базовий курс імунізації

Люди віком від 18 років

- Всі люди старші 18 років мають отримати **первинний курс імунізації** двома дозами вакцини від COVID-19 (Comirnaty/Pfizer-BioNTech або CoronaVac/Sinovac Biotech) або однією дозою вакцини Janssen (Johnson & Johnson).

Вакцинація дітей 12+

- Діти від 12 років можуть щепитися від COVID-19 двома дозами вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Вакцинація дітей 5-11 років

- В Україні можна щепити дітей віком 5-11 років вакциною Comirnaty (Pfizer).
- Для щеплення дітей використовують спеціальну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech, одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей 12+.
- Інтервал введення між першою та другою дозою становить мінімум 21 день.

З собою потрібно мати Свідоцтво про народження дитини та посвідчення особи одного із батьків або опікуна. Також для дітей віком 5-11 років обов'язково є заповнена інформована згода батьків або опікунів - форма №063-2/о. Її нададуть в місці проведення вакцинації.



COVID-19 нікуди не зник. Люди досі хворіють та помирають від важкого перебігу хвороби. У процесі вивчення штамів COVID-19 стало зрозумілим, що вакцинація залишається найефективнішою зброєю проти цього сильного вірусу.

Вакцини проти COVID-19 – одні з найефективніших в історії людства. Вони так само ефективні, а можливо і ефективніші, ніж вакцини від поліомієліту, вітряної віспи, кору та грипу.

Усі вакцини схвалені для використання ВООЗ, мають високу ефективність, забезпечують надійний захист, запобігаючи тяжкому перебігу захворювання, ризику госпіталізації та смерті від коронавірусу.

Особливо важливо вакцинуватися людям, які мають хронічні захворювання та людям літнього віку. Їм загрожує важкий перебіг хвороби і навіть летальні наслідки.

Додаткова доза

- Люди з рядом важких хвороб, у яких міг не сформуватися належний імунітет після двох доз антиковідної вакцини, можуть отримати додаткову дозу вакцини вже через 28-90 днів після другої.

Хто може отримати додаткову дозу вакцини

- ✓ Люди з різними видами раку крові
- ✓ Люди з ВІЛ-інфекцією
- ✓ Люди після трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин
- ✓ Люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію
- ✓ Люди після хіміотерапії або променевої терапії
- ✓ Люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації

Якщо лікар визначить, що такий людині потрібна додаткова доза антиковідної вакцини, він видасть направлення в довільній формі на щеплення третьою дозою.

Додаткову дозу можна зробити тією самою вакциною, якою ви робили перші дві, або будь-якою іншою вакциною проти COVID-19 за дозволеними в Україні схемами міксування.

Бустерні дози

1-а бустерна доза:

- З часом після вакцинації від COVID-19 поступово знижується рівень імунної відповіді. Крім того, на ефективність вакцин впливає і поява нових мутованих штамів коронавірусу.

- Введення бустерної дози дозволяє поновити захист від COVID-19 та подовжити захист.

- Бустерну дозу не слід плутати із додатковою.

Додаткова доза потрібна людям з ослабленим через важкі хвороби імунітетом.

Її роблять через 28-90 днів після базового курсу щеплення та вона не впливає на термін дії COVID-сертифіката.

- Люди з ослабленим імунітетом, які отримали додаткову дозу, також зможуть отримати бустерну дозу. Рекомендований термін — через 3 місяці після додаткової дози.

Люди старші 18 років:

- В Україні бустерне щеплення можуть зробити всі люди старші 18 років, які отримали дві дози вакцини понад 5 місяців тому.

- Бустерну дозу також можна зробити **тією ж вакциною**, якою робили базовий курс, або **іншою вакциною** згідно з дозволеними в Україні схемами.



Інтервал введення дводозних вакцин

CoronaVac/Sinovac — 14-28 днів

Comirnaty/Pfizer — 21-28 днів

змішана схема CoronaVac + Pfizer - 28 днів

Схеми комбінування вакцин

Якщо вакцини, якою ви робили першу дозу, зараз немає, друге щеплення чи бустер можна зробити будь-якою наявною вакциною.

Схеми комбінування вакцин, закріплені у позиції Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики від 18.08.2022 року, яка ґрунтується, на рекомендаціях Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації ВООЗ від 16.01.2021.

Найкраща вакцина та, яка зараз є доступна.

Діти віком 12-17 років:

- 1-ше бустерне щеплення можуть зробити діти віком **12-17 років** за наявності достатньої кількості вакцини для груп ризику важкого перебігу хвороби.

- Підліткам бустерну дозу рекомендують **через 6 місяців** після завершення первинного курсу вакцинації.

- **Для бустерного щеплення дітей віком від 12 років потрібно використовувати тільки мРНК-вакцину**, яка схвалена до використання у цій віковій групі (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer).

2-а бустерна доза:

- Через 4 місяці після першого бустерного щеплення дорослим з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення.

- Як перший, так і другий бустер можна робити вакцинами Pfizer, Janssen або CoronaVac після первинного курсу будь-якими вакцинами, у тому числі за змішаною схемою.

Знайдіть адресу та контакти найближчого центру або пункту вакцинації від COVID-19:

<https://vaccination.covid19.gov.ua/list>

Вакцинуйтеся та захистіть себе!